

アメリカザリガニ

Procambarus clarkii

アメリカザリガニ科



アメリカザリガニ。円内はザリガニの頭とはさみ

魚類

底生動物

両生類
爬虫類

トンボ

チョウ

樹木

(在来種) 草花

(外来種) 草花

哺乳類

(水辺) 鳥類

(草原・樹林) 鳥類
ワシ・タカ

名前の由来

アメリカ原産のザリガニのため。ザリガニは「砂利にいるカニ」か？ 漢字名：アメリカ砂利蟹

形態的特徴

体長10cmくらい。成体の体色が赤い。

はさみと頭部にゴツゴツとしたトゲが多い。頭の前（目と目の間）が三角形で一つの山になっている。

類似種と見分け方：ザリガニ・ウチダザリガニ。

アメリカザリガニは、十勝では温泉排水のみに生息している。

ウチダザリガニの頭の前（目と目の間）はギザギザで三つ

の山になっているが、アメリカザリガニやザリガニでは三角形で一つの山になっている。

ザリガニの頭やはさみにトゲはないが、アメリカザリガニでは、ゴツゴツとしたトゲが多い。

生息環境・分布

冬期も水温の高い水域で泥底を好む。

環境省・国交省水質調査：「大変きたない水」の指標種。

分布：国外分布は、アメリカ中南部・メキシコ北東部。国内分布は、日本全土。北海道内では、温泉などにより冬期

も水温の高い水域に分布。

十勝地方では、温泉排水が流入している水域のみに生息。

食性・他の生物との関わり

堆積した有機物から小動物まで摂食する雑食性。

アオサギ等の大型鳥類の餌ともなっている。



アメリカザリガニ

繁殖生態・寿命

1才～2才で繁殖。交尾から1～3ヶ月後に200～1000個（700粒程度）の卵を産む。

飼育下では4年以上生育する

興味深い話

■1930年にウシガエルの餌として輸入され、屋外へと分散してしまっ。北海道へは家庭での飼育用として販売されていたものが放されて定着したと思われる。

■汚濁に耐えるため飼育は容易である。

配慮事項

特になし。

生活サイクル

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
確認できる時期				■									

参考文献

「旭川市博物館企画展冊子」1998

「川の生物図典」財団法人リバーフロント整備センター 1996

「ニホンザリガニってどんな生き物(講演記録)」川井唯史、里川づくり実行委員会(2007) <http://www.netbeet.ne.jp>

~/kikuchi/zarigani/symposium2006/01.pdf